

Δυϊκότητα

Δημήτρης Φωτάκης

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Πιστοποίηση Άνω Φράγματος

- Έχει το ΓΠ **εφικτή λύση** με κόστος ≤ 2 ;

$$\begin{array}{ll} \min & 2x_2 + x_4 + 5x_7 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1 + x_5 = 2 \\ & x_3 + x_6 = 3 \\ & 3x_2 + x_3 + x_7 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{array}$$

- **Ναι**, π.χ. $[0, 1, 3, 0, 2, 0, 0]$.

Πιστοποίηση Κάτω Φράγματος;

- Έχει το ΓΠ **εφικτή λύση** με κόστος < 2 ;
- Έχουν **όλες** οι εφικτές λύσεις **κόστος ≥ 2** ;

$$\begin{array}{ll} \min & 2x_2 + x_4 + 5x_7 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1 + x_5 = 2 \\ & x_3 + x_6 = 3 \\ & 3x_2 + x_3 + x_7 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{array}$$

- Αν όλες οι εφικτές λύσεις **έχουν κόστος ≥ 2** ,
πως θα το **πιστοποιήσουμε**;

Πιστοποίηση Κάτω Φράγματος

$$\begin{array}{ll} \min & 2x_2 + x_4 + 5x_7 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1 + x_5 = 2 \\ & x_3 + x_6 = 3 \\ & 3x_2 + x_3 + x_7 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} -x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = -4 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 6 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} 2 = -x_1 + 2x_2 - x_4 + x_7 \\ \leq 2x_2 + x_4 + 5x_7 \end{array}$$

- Το $[0, 1, 3, 0, 2, 0, 0]$ (κόστος 2) είναι
βέλτιστη λύση (με απόδειξη) !

Υπολογισμός Κάτω Φράγματος

$$\begin{array}{ll}\min & 7x_1 + x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} & x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 10 \\ & 5x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

□ Λύση $[1.8, 0, 3]$ με κόστος 27.6 . Καλύτερη;

$$\left. \begin{array}{l} 2x_1 - 2x_2 + 6x_3 \geq 20 \\ 5x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 6 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{c} 26 \leq 7x_1 + 5x_3 \\ \leq 7x_1 + x_2 + 5x_3 \end{array}$$

Υπολογισμός Κάτω Φράγματος

$$\begin{array}{ll}\min & 7x_1 + x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} & \begin{aligned} x_1 - x_2 + 3x_3 &\geq 10 \\ 5x_1 + 2x_2 - x_3 &\geq 6 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\max & 10y_1 + 6y_2 \\ \text{s.t.} & \begin{aligned} y_1 + 5y_2 &\leq 7 \\ -y_1 + 2y_2 &\leq 1 \\ 3y_1 - y_2 &\leq 5 \\ y_1, y_2 &\geq 0 \end{aligned}\end{array}$$

□ Λύση $[1.8, 0, 3]$ με κόστος **27.6. Καλύτερη;**

$$\left. \begin{array}{l} y_1(x_1 - x_2 + 3x_3) \geq 10y_1 \\ y_2(5x_1 + 2x_2 - x_3) \geq 6y_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \Rightarrow 10y_1 + 6y_2 \leq (y_1 + 5y_2)x_1 + (-y_1 + 2y_2)x_2 + (3y_1 - y_2)x_3$$

□ **Πρωτεύον** (primal) και **δυϊκό** (dual) ΓΠ.

Υπολογισμός Κάτω Φράγματος

$$\begin{array}{ll}\min & 7x_1 + x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} & x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 10 \\ & 5x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\max & 10y_1 + 6y_2 \\ \text{s.t.} & y_1 + 5y_2 \leq 7 \\ & -y_1 + 2y_2 \leq 1 \\ & 3y_1 - y_2 \leq 5 \\ & y_1, y_2 \geq 0\end{array}$$

- Δυϊκό λύση $y = [2, 1]$ ωφέλειας 26
(κάτω φράγμα στο πρωτεύον).
- Πρωτεύον λύση $x = [1.75, 0, 2.75]$ κόστους 26 !
- Ισότητα δεν είναι τυχαία !
Θεώρημα Δυϊκότητας στο ΓΠ.

Άλλο Παράδειγμα

$$\begin{array}{ll} \min & 2x_2 + x_4 + 5x_7 \\ \text{s.t.} & \begin{array}{lcl} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & = & 4 \\ x_1 + x_5 & = & 2 \\ x_3 + x_6 & = & 3 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 & = & 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 & \geq & 0 \end{array} \\ & \max & 4y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 6y_4 \\ & \text{s.t.} & \begin{array}{lcl} y_1 + y_2 & \leq & 0 \\ y_1 + 3y_4 & \leq & 2 \\ y_1 + y_3 + y_4 & \leq & 0 \\ y_1 & \leq & 1 \\ y_2 & \leq & 0 \\ y_3 & \leq & 0 \\ y_4 & \leq & 5 \end{array} \end{array}$$

- Πρωτεύον λύση $[0, 1, 3, 0, 2, 0, 0]$ κόστους 2.
- Δυϊκό λύση $[-1, 0, 0, 1]$ ωφέλειας 2.

Δυϊκότητα

- Πρωτεύον: $p = \min\{c^T x : Ax \geq b, x \geq 0\}$
- Δυϊκό : $d = \max\{b^T y : A^T y \leq c, y \geq 0\}$
 $d = \min\{(-b^T)y : (-A^T)y \geq -c, y \geq 0\}$
- Δυϊκό του δυϊκού :
$$\begin{aligned} & \max\{(-c^T)z : (-A^T)^T z \leq -b, z \geq 0\} \\ &= \min\{c^T z : Az \geq b, z \geq 0\} = p \end{aligned}$$
- ... είναι το πρωτεύον!

Ασθενής Δυϊκότητα

- Πρωτεύον: $p = \min\{c^T x : Ax \geq b, x \geq 0\}$
- Δυϊκό : $d = \max\{b^T y : A^T y \leq c, y \geq 0\}$
- **Ασθενής Δυϊκότητα** : αν x και y εφικτές λύσεις για το πρωτεύον και δυϊκό, $c^T x \geq b^T y$
$$c \geq A^T y \Leftrightarrow c^T \geq (A^T y)^T = y^T A$$
$$c^T x \geq (y^T A)x = y^T(Ax) \geq y^T b = b^T y$$
- Αν πρωτεύον και δυϊκό εφικτά, $p \geq d$

Ισχυρή Δυϊκότητα

- Πρωτεύον: $p = \min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$
- Δυϊκό : $d = \max\{b^T y : A^T y \leq c\}$
- **Ισχυρή Δυϊκότητα** : αν **πρωτεύον βέλτιστη λύση, δυϊκό βέλτιστη λύση και $p = d$**

$$\left. \begin{array}{l} x_B^* = A_B^{-1}b \\ x_N^* = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{lcl} c^T x^* & = & c_B^T x_B^* \\ & = & (c_B^T A_B^{-1})b \\ & = & y^T b \end{array} = c_B^T (A_B^{-1}b)$$


- $y = (A_B^{-1})^T c_B$ εφικτή και βέλτιστη λύση για δυϊκό.

$$0 \leq c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N = c_N^T - y^T A_N \Rightarrow A_N^T y \leq c_N$$

- Βέλτιστη για δυϊκό εύκολα από **ταμπλό Simplex**.


Συνέπειες

- Αν πρωτεύον και δυϊκό επιλύσιμα,
βέλτιστες λύσεις με ίδια τιμή.
- Αν πρωτεύον μη-φραγμένο,
δυϊκό μη-επιλύσιμο.
- Αν δυϊκό μη-φραγμένο,
πρωτεύον μη-επιλύσιμο.
- Πρωτεύον και δυϊκό μη-επιλύσιμα.



Συνέπειες

	Βέλτιστη	Μη-φραγμ	Μη-επιλυσ
Βέλτιστη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μη-φραγμ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Μη-επιλυσ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Κατασκευή Δυϊκού

- $\min \leftrightarrow \max$
- Ισότητα \leftrightarrow Μεταβλητή μη-περιορισμένο πρόσημο
- Ανισότητα \leftrightarrow Μεταβλητή μη-αρνητική

$$\begin{array}{lll} \min cx & & \max by \\ A_i x = b_i & i \in M_e & y_i \geqslant 0 \\ A_i x \geq b_i & i \in M_i & y_i \geq 0 \\ x_j \geq 0 & j \in N_r & A^j y \leq c_j \\ x_j \geqslant 0 & j \in N_u & A^j y = c_j \end{array}$$

Complementary Slackness

- Εφικτές λύσεις x (πρωτεύον) και y (δυϊκό) είναι βέλτιστες ανν
 - Συνθήκες πρωτεύοντος:
 $\forall j \in [m] x_j(c_j - A^j y) = 0$ ($x_j \neq 0 \Rightarrow A^j y = c_j$)
 - Συνθήκες δυϊκού:
 $\forall i \in [n] y_i(A_i x - b_i) = 0$ ($y_i \neq 0 \Rightarrow A_i x = b_i$)
- $$\begin{aligned} c^T x - b^T y &= c^T x - y^T A x + y^T A x - y^T b \\ &= x^T (c - A^T y) + y^T (A x - b) \geq 0 \end{aligned}$$
- $$c^T x = b^T y \Leftrightarrow x^T (c - A^T y) = 0 \wedge y^T (A x - b) = 0$$

Παράδειγμα

$$\begin{array}{ll}\min & 7x_1 + x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} & x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 10 \\ & 5x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\max & 10y_1 + 6y_2 \\ \text{s.t.} & y_1 + 5y_2 \leq 7 \\ & -y_1 + 2y_2 \leq 1 \\ & 3y_1 - y_2 \leq 5 \\ & y_1, y_2 \geq 0\end{array}$$

- Πρωτεύον λύση $x = [1.75, 0, 2.75]$ κόστους 26.
- Δυϊκό λύση $y = [2, 1]$ ωφέλειας 26.
 - Αλλαγή b σε $b' = [10.5, 6.5]$. Πως μεταβάλλεται το κόστος της βέλτιστης λύσης.

Παράδειγμα

$$\begin{array}{ll}\min & 2x_2 + x_4 + 5x_7 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1 + x_5 = 2 \\ & x_3 + x_6 = 3 \\ & 3x_2 + x_3 + x_7 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0\end{array}$$


$$\begin{array}{lll}\max & 4y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 6y_4 \\ \text{s.t.} & y_1 + y_2 \leq 0 \\ & y_1 + 3y_4 \leq 2 \\ & y_1 + y_3 \leq 0 \\ & y_1 \leq 1 \\ & y_2 \leq 0 \\ & y_3 \leq 0 \\ & y_4 \leq 5\end{array}$$

- Πρωτεύον λύση $[0, 1, 3, 0, 2, 0, 0]$ κόστους 2.
- Δυϊκό λύση $[-1, 0, 0, 1]$ ωφέλειας 2.

Primal-Dual

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{e \in E} w(e)x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \text{out}(v)} x_e - \sum_{e \in \text{in}(v)} x_e = 0 \quad \forall v \in V \setminus \{s, t\} \\ & \sum_{e \in \text{in}(t)} x_e - \sum_{e \in \text{out}(t)} x_e = 1 \\ & x_e \geq 0 \quad \forall e \in E \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \max \quad & y_t \\ \text{s.t.} \quad & y_v - y_u \leq w(u, v) \quad \forall (u, v) \in E \\ & y_s = 0 \end{aligned}$$



Αλγόριθμος Dijkstra

$$\begin{array}{ll}\min & \sum_{e \in E} w(e)x_e \\ \text{s.t.} & \sum_{e \in \text{out}(v)} x_e - \sum_{e \in \text{in}(v)} x_e = 0 \quad \forall v \in V \setminus \{s, t\} \\ & \sum_{e \in \text{in}(t)} x_e - \sum_{e \in \text{out}(t)} x_e = 1 \\ & x_e \geq 0 \quad \forall e \in E\end{array}$$


$$\begin{array}{ll}\max & y_t \\ \text{s.t.} & y_v - y_u \leq w(u, v) \quad \forall (u, v) \in E \\ & y_s = 0\end{array}$$



Μέγιστο Ταιριασμα

□ **Ταιριασμα** : ακμές χωρίς κοινά άκρα.


$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e: v \in e} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V \\ & x_e \in \{0 \geq 1\} \quad \forall e \in E \end{aligned}$$



Ελάχιστο Κάλυμμα Κορυφών

- **Κάλυμμα Κορυφών** : σύνολο κορυφών ώστε κάθε ακμή έχει ένα τουλάχιστον άκρο της σε αυτό.

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{v \in V} y_v \\ \text{s.t.} \quad & y_v + y_u \geq 1 \quad \forall \{v, u\} \in E \\ & y_v \in \{0, 1\} \quad \forall v \in V \end{aligned}$$



Δυϊκότητα

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e: v \in e} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V \\ & x_e \geq 0 \quad \forall e \in E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{v \in V} y_v \\ \text{s.t.} \quad & y_v + y_u \geq 1 \quad \forall \{v, u\} \in E \\ & y_v \geq 0 \quad \forall v \in V \end{aligned}$$

- Ταίριασμα M και σύνολο κάλυψης C , $|C| \geq |M|$
- Ταίριασμα M και σύνολο κάλυψης C : $|C| = |M| \Rightarrow M$ μέγιστο και C ελάχιστο.

